AVES

DE LA PENINSULA VALDES

LA PRIMER HOSTERIA ECOLOGICA DE LA PATAGONIA ARGENTINA. VISITE WWW.ECOHOSTERIA.COM.AR
LO ESPERAMOS EN PUERTO PIRÁMIDES - PENÍNSULA VALDES - CHUBUT - PATAGONIA ARGENTINA

FOTOS: WWW.ALEAVA.NET

6. AVES

6.1 PINGÜINO DE MAGALLANES

SPHENISCUS MAGELLANICUS

También conocido como Pingüino de Magallanes, Pajaro Niño, Pájaro Bobo, Pájaro Asno, Pingüino Patagónico o Pingüino Común. Nos visitan de a miles y nos permiten observarlos muy, muy de cerca.

Los Pingüinos son aves perfectamente adaptadas a la vida acuática marina dentro de bajas temperaturas. Por tal motivo su cuerpo tiene forma de huso originado evolutivamente para un mejor desplazamiento en el agua, resultando una forma corpórea altamente hidrodinámica.

El pico de los Pingüinos es achatado verticalmente, muy fuerte, largo y curvo en su extremo. Estas

características, hacen que sea una excelente herramienta para apresar su alimento.

Como otras aves el interior de su pico está adaptado para poder regurgitar el alimento transportado para sus crías.

En el paladar posee “rugas (arrugas) palatinas” cuya disposición favorece el avance del alimento capturado hacia el esófago y evita que la presa se escape.

Las alas de los Pingüinos son cortas, muy aplanadas y fuertes. Con ellas son incapaces de levantar vuelo en el aire; pero su desplazamiento en el agua es realmente un vuelo acuático más que natación. Por ello su esternón es también muy poderoso, además de ser un escudo para soportar los golpes de zambullidas desde alturas considerables.

En el agua, esas alas son verdaderas hélices que impulsan al Pingüino a velocidades de hasta 45 kilómetros por hora. Le permiten -utilizando sus patas como timón- realizar maravillosas y rápidas acrobacias, tan necesarias para la captura de su alimento como para poder huir de sus predadores.

COMPORTAMIENTO

Las aves no reproductoras se agrupan debajo de los arbustos a descansar a la sombra.

A fines de enero y febrero, grupos de juveniles nacidos la temporada anterior, pasan casi dos semanas en tierra donde mudan su plumaje juvenil por el de adulto.

Todos los pingüinos mudan una vez por año y durante ese tiempo permanecen en tierra sin alimentarse.

Los pingüinos utilizan gran parte de su tiempo en la cosmética de su plumaje, frotándose con el pico, limpiando las plumas para mantener la estructura de la misma y así contribuir a la impermeabilidad.

REPRODUCCION

Los machos son apenas más grandes que las hembras y poseen picos más largos y anchos. El macho pesa alrededor de 4 a 5 Kg y mide 45 cm. Alcanzan la madurez sexual a los 4 o 5 años los dos sexos. Cada año a fines de agosto, principio de setiembre comienzan a llegar los machos y luego lo hacen las hembras; los machos acondicionan los nidos ya construídos años anteriores.

Nidifican hasta aproximadamente 800 metros de la costa, pero accidentes naturales hacen que su

Las hembras ponen generalmente dos huevos y tras 40 días de incubación compartida con el macho, nacen los pichones.

caminata desde el mar pueda ser de más de un kilómetro.

Las hembras ponen generalmente dos huevos a comienzos de octubre y tras 40 días de incubación compartida con el macho nacen los pichones.

Ambos sexos defienden el nido y alimentan los pichones con peces, como anchoítas y calamar. Los pichones nacen cubiertos de plumón gris oscuro, el cual pierden en fe-

brero cuando mudan a plumaje juvenil. En este momento se independizan realizando sus primeras incursiones al mar en busca de alimento.

Al año siguiente recién adquirirán el plumaje adulto tras otra muda.

Podrá ver pingüinos en Punta Cantor y Estancia San Lorenzo.

SU RELACION CON EL HOMBRE

Si bien no temen la presencia del hombre, tampoco son 100% sociables. Suelen correr detrás de las personas que caminan entre los nidos, y si alguien se acerca demasiado o intenta tocarlos, no duden de que recibirá un doloroso picotazo.

Aunque los pingüinos tienen la suerte de no poseer nada que la gente desee comercializar, igualmente se ven perjudicados por la acción del ser humano, por la sobrepesca y por la contaminación de las aguas, especialmente con las pérdidas de petróleo en mar abierto. Una vez empetrolados, las plumas de los pingüinos pierden su capacidad aisladora, por lo que pierden temperatura y buscan refugio en las playas donde mueren por intoxicación e inanición.

Por ello es muy importante la generación de conciencia y legislaciones estrictas para el transporte y extracción de petróleo.

6.2 CHOIQUE

PTEMENEMIA PEMIATA

Es el símbolo de la Patagonia. Fuente de inspiración de cuentos y leyendas, el choique está tan presente en el folklore como en los caminos que recorren nuestra patagonia.

Ave grande herbívora y no apta para volar. Utilizan sus alas blandas como estabilizadores, y son veloces corredores. Es uno de los dos “avestruces americanos”, pero a diferencia de su pariente africano tiene tres dedos en lugar de dos.

Las hembras depositan sus 8 a 10 huevos al cuidado del macho, el cual se encarga de la crianza de los “charitos”, quienes siguen a su padre durante

casi todo el verano. En invierno forman grupos mixtos de machos, hembras y juveniles. El harén está compuesto por un macho y de una a quince hembras. Esto varía según la zona, ya que parece estar muy afectado por la oferta alimenticia.

El macho mide 1.50 metros y llega a pesar hasta 30 kilos, la hembra es de menor altura.

Se alimenta de hierbas, bajando su cabeza y largo cuello. También se alimentan de granos, pan, moscas e insectos que atrapan en el aire; a veces no desprecian elementos de metal, monedas, pequeñas piedras.

SU RELACION CON EL HOMBRE

El choique ha sido una de las especies de la fauna silvestre a la que más uso le ha dado el hombre en la Argentina. Para los aborígenes patagónicos era el alimento preferido junto con el guanaco y lo aprovechaban íntegramente: la carne, cartílagos y grasa eran consumidos para la alimentación, las plumas como ornamento, abanicos y espantamoscas, los tendones de las patas eran usados en la confección de sogas para boleadoras, los huesos para instrumentos musicales el cuero para tabaquerías y alforjas y la cáscara de los huevos y la barba de las plumas como medicinas. También es el protagonista de incontables leyendas, como en el siguiente relato, que cuenta como un choique fue el origen de la constelación Cruz del Sur.

LEYENDA DE LOS MOCOVÍES Y LA CRUZ DEL SUR

“El viejo cacique recordó que su padre le había dicho que Manic, el ñandú, era el animal poseedor de las más hermosas plumas.

El cacique mandó llamar al mejor cazador de la tribu: Nemec, un joven ágil y fiel.

El muchacho buscó sus mejores armas. Jamás había visto un ñandú y la fama que tenía esta misteriosa ave de tierras adentro era de inalcanzable.

Nemec consultó con los ancianos de la tribu para que le dieran consejos. Le dijeron que Manic era muy

veloz, que era imposible encontrarlo sin que él lo notara. Que tenía que buscar una huella parecida a la de un ave, pero mucho más grande, y que lo fundamental era seguir el camino del Sur. Nemec, agradecido, partió con el honor y la responsabilidad de semejante objetivo.

Caminó días y días hasta que una tarde encontró las huellas: iban en dirección al Sur y las siguió. Caminando bajo las primeras luces del día siguiente, percibió algo extraño. Levantó la vista y allí estaba.

Era el ñandú, con sus largas y finas patas, con su hermoso plumaje sacudido por el viento, moviendo la pequeña cabeza sostenida por el cuello largo, como buscando no sé qué... Pero lo que más le llamó la atención fueron sus plumas y entonces supo por qué el cacique deseaba tenerlas.

Nemec recordó su deber. Se acercó sigilosamente. Ya casi arrojaba la lanza cuando el veloz ñandú escapó a toda velocidad dejando al cazador sorprendidísimo.

Al otro día, Nemec siguió las huellas y nuevamente dio con el objetivo. Pero el ñandú volvió a escaparse. Más tarde sucedió lo mismo.

Nemec empezó a dudar de si realmente llegaría a cazarlo. Entonces lo halló a su paso al atardecer. Allí estaba, y la oportunidad no podía ser desperdiciada. Hombre y animal se quedaron inmóviles. De repente, Nemec corrió con todas sus fuerzas. El ñandú lo hizo huyendo. El brazo se flexionó y lanzó el arma. Y ante los ojos del mocoví, Manic desplegó sus alas y se elevó. Y continuó ascendiendo hasta que subió al cielo y en la tenue luz del atardecer se perdió de vista.

De pronto, en el mismo lugar en

Pichón de choique o "charito".

que el ñandú había desaparecido, surgieron cuatro estrellas en forma de cruz: una ocupaba el lugar de la cabeza, dos marcaban las puntas de sus alas y la última, la terminación de sus patas.

Nemec pasó toda la noche contemplando el cielo y recordando las imágenes del ñandú que jamás podría cazar. Al día siguiente emprendió el regreso.

Por primera vez lo vieron llegar a la tribu con las manos vacías, pero con un brillo nuevo en los ojos.

Esa noche, cuando toda la gente se sentó alrededor de la fogata, Nemec contó su extraña aventura.

Entonces vieron las nuevas estrellas que lucía el cielo, indicando para siempre la dirección por donde Namic había escapado: hacia el Sur.”

6.3 JOTE

CATHARTES AURA

El Jote cabeza colorada es un ave de la familia de los buitres que habita por toda América. En los diferentes países del continente tiene nombres distintos, tales como zopilote, aura, urubú o zamuro.

El que habita en Península Valdés es el mayor de los jotes, de cabeza roja de plumaje color negruzco, más castaño en la superficie superior de las alas.

Tiene la superficie inferior de las plumas de vuelo de color gris, creando un importante contraste. La cabeza es pequeña en proporción al cuerpo y no tiene plumas, en los adultos es rojiza y en las especies jóvenes es negra.

Pesa entre 1,4 y 2,7 kg, mide de 60 a 76 cm de longitud y tiene una envergadura de hasta 2 metros.

Planea con las alas en forma de “V” y frecuentemente se balancea de una manera que da la sensación de que está ebrio.

Suelen verse en Puerto Pirámides, sobrevolando todo el valle, y aprovechando las térmicas que genera el viento sobre las bardas que protegen al Pueblo de Este a Oeste, sobre el lado Norte.

Para buscar su alimento, además de planear y recorrer grandes distancias a “bajo precio” busca con su agudo olfato (a diferencia del Jote, que lo hace con la vista) restos de animales muertos, como lobos marinos en la costa, zorros, guanacos, liebres y conejos. Además, cuando encuentra alimento en gran cantidad, como podría ser un bovino muerto, planea en círculos sobre los restos, avisando a otros individuos del gran festín que se avecina.

6.4 FLAMENCO

PHOENICOPTERUS CHILENSIS

El Flamenco Austral es un ave grande que se la suele ver en grandes bandadas. Llegan a medir un metro y medio, son fáciles de identificar por su color rosado en las plumas exteriores, su cuello alargado, sus largas patas y grandes alas. Si pudiésemos ver de cerca sus patas, veríamos que tienen unos dedos cortos unidos por membranas entre los dedos, que le ayuda a desplazarse nadando en el agua, como los patos.

Los flamencos machos son más grandes que las hembras y esta característica es la única diferencia visible entre ambos sexos. El color de sus plumas lo adquieren por el alimento que ingieren, es por eso que sus crías nacen blancuzcas y van tomando ese color tan intenso, a medida que zapatean el fango o la costa del mar y comen pequeños crustáceos.

No anidan en la zona de Península Valdés, en cambio si lo hacen en lagunas de la Provincia de la Pampa.

Son animales muy salvajes, la presencia humana los ahuyenta fácilmente. Por eso si le gusta la fotografía, tómese su tiempo y sea paciente, o límitese a no espantarlos. La mejor forma de fotografiarlos es esperarlos en un lugar, camuflados, ya apostados cuando la marea está subiendo, momento en el que ellos se acercan caminando al compás de la marea. Un buen lugar son los tamariscos costeros. Ese trabajo lo realizamos fotógrafos profesionales que vivimos en la zona y lo intentamos una y otra vez, porque no es fácil hacer una

buena foto de estas ariscas aves.

Los Flamencos no están para nada humanizados, viven en estado totalmente salvajes, y por lo tanto son muy huidizos.

Recuerde que Península Valdés es una Gran Maternidad y necesita respeto y que minimicemos nuestro propio impacto. Piense que ya son 300.000 turistas que al año visitan Península y se ve afectado por nuestra humana voracidad. Ayude a concientizar con su propio ejemplo.

REPRODUCCION

Los flamencos son aves monógamas. Antes de la formación de la pareja, machos y hembras se reúnen en grupos de hasta 150 individuos, y realizan la denominada “marcha nupcial”. Todos, en conjunto, con los cuellos extendidos hacia arriba, mueven energicamente la cabeza de un lado a otro y marcha en un solo sentido. Acompaña a la marcha un graznido ronco y fuerte del todo el grupo. Posteriormente se produce la formación de parejas.

Semanas después, comienza la ni-

dificación, los flamencos forman colonias de cría que se caracterizan por congregarse a miles de individuos. El nido generalmente es de barro, en forma de cono truncado, con una depresión en el centro, con lugar para el único huevo que pondrá la hembra. Luego de 30 días de incubación compartida entre ambos padres, las crías nacen con plumaje blanco y el pico recto, tomando la forma corva de los adultos según van creciendo. Después de una semana o más días de vida, los pichones se reúnen en creches o parvadas de hasta miles de individuos que permanecen juntos, vigilados por algunos adultos. Luego de algunas semanas, los pichones ya han cambiado de aspecto. El color del plumaje se ha vuelto gris y las patas negras, y el pico se va curvando hasta parecerse a los de los padres. Las parvadas se mantienen unidas hasta los tres meses de vida, momento en los juveniles están en condiciones de valerse por sus propios medios.

*La mejor época para verlos:
de Septiembre a Abril
en Isla de los Pájaros.*

6.5 GAVIOTA COCINERA

LARUS DOMINICANUS

Es la más abundante de nuestras costas, por su enorme población y múltiples relaciones, se la considera uno de los componentes más importantes en la dinámica de muchas localidades de la costa patagónica.

Puede medir hasta 60 centímetros de longitud, el cuerpo es blanco y las alas negras. Se instala en toda la Patagonia, hasta Tierra del Fuego. También llega a las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y la Antártida.

Ponen hasta tres huevos, nidifican y regresan a la misma zona todos los años. Se alimenta de recursos del intermareal, aunque su comportamiento es muy oportunista y se ha visto modificada por la oferta de comida generada por el hombre.

Debido a esto, el crecimiento de las poblaciones de gaviotas cocineras ha ido creciendo considerablemente. Se alimentan en los basurales a cielo abierto, de carroña, insectos, granos, peces pequeños y... ¡ballenas!

A continuación explicamos esta peculiar práctica de las gaviotas de nuestras costas.

ATAQUES A BALLENAS

En la última década la ballena franca se vió afectada por el ataque de Gaviotas Cocineras, que encontraron en la piel y la grasa de la ballena, proteínas al parecer bastante apetitosas. Con el correr de los años, la técnica que habían desarrollado solo algunas gaviotas, fue aprendida por nuevas gaviotas, haciendo que los ataques sean cada vez mas frecuentes y alterando el comportamiento de estos gigantes cetáceos. Por otra parte, los descartes pesqueros y los basurales a cielo abierto, principalmente el basural de Puerto Madryn, favorecieron la proliferación de gaviotas que al tener alimento garantizado todo el año, aumentó su tasa de natalidad. Como resultado, el número de ejemplares creció exponencialmente en Península Valdés.

Las Ballenas se curvan ante el picotazo de las Gaviotas, para evitar el ataque, adoptando la posición que hasta cobró nombre “de Galeón” y consiste en dejar la cabeza fuera, curvar el resto del cuerpo y sacar solo la aleta caudal fuera del agua, minimizando la zona del cuerpo expuesta en superficie a merced de nuevos picotazos, también tratan de sacarse las gaviotas de encima nadando, estando mas tiempo

sumergidas o a veces saltando.

Todas estas técnicas evasivas generan en la ballena un mayor consumo de energía y reservas. Sobre todo tomando en cuenta que Península Valdés es un área de reproducción y cría donde la alimentación no es habitual.

CASO DE ESTUDIO

En el año 2005 un grupo de estudio liderado por la Licenciada en Ciencias Biológicas Ana Fazio, y el Dr. Marcelo Bertellotti, planificaron un estudio con 3 años de duración, en el cual lo primero que querían saber era, si el comportamiento de alimentación de piel y grasa de las ballenas estaba o no generalizado en toda la población de gaviotas cocineras. Procedieron a anillarlas, para poder identificarlas cuando estuvieran atacando. Esta tarea se realizó en la plataforma de la lobería de Punta Pirámide, donde anida una colonia reproductiva de esta especie. Se capturó a las gaviotas con una red accionada por un cañón, se las anilló con anillos de PVC con códigos individuales y se les tomaron muestras de sangre, plumas, isopados de cloaca, pico, etc. (para saber el estado de salud de la población).

A pesar del gran esfuerzo y las horas de trabajo de todo el grupo, cada vez fue más difícil capturar gaviotas, porque aprendieron muy rápido y no se dejaron atrapar, y se logró anillar tan solo un 20% de la población.

Además hay gaviotas que vienen de otros lugares a alimentarse de las ballenas. Ana comenta que “(...)por estas dos razones, la marca estuvo muy diluída, tuvimos solo el 2% de los casos donde pudimos observar una gaviota con anillo atacando. Igualmente, con tantas horas y días de observación en el agua, se podía ver que, si bien no eran todas las gaviotas las que atacaban, tampoco era un grupo pequeño, y lo peor ¡eran cada vez más!

También tenemos un registro total de la Tasa de Ataques durante las tres temporadas de ballenas, conociendo los picos de las curvas (momentos de mayor cantidad de ataques por unidad de tiempo).

Esta información es muy útil, ya que a la hora de tomar cartas en el asunto, si se decide eliminar gaviotas atacantes, se podrá comparar con años anteriores y ver si disminuye o no la Tasa de Ataque. Por otro lado,

se analizaron las muestras de gaviotas para buscar elementos patógenos que puedan llegar a contagiar a las ballenas y los encontramos; es algo que realmente nos preocupa. Consideremos que una gaviota pica a una ballena y al rato está picando a otra, y luego a otra. La gaviota podría ser un vector que transporta un elemento patógeno propio de ballena, a otra ballena (también sacamos muestras de piel de ballenas y vimos indicadores). En un lugar como Península Valdés, donde vienen tantas ballenas,

permanecen todas juntas y con crías, que son las mas vulnerables, puede ser que se transmitan enfermedades. Así que todo esto es algo más profundo que el cambio de comportamiento de la ballena, sin olvidarnos que también les duele cuando las pican”.

Una de las conclusiones más importantes, consensuada por mayoría, era cerrar el basural a cielo abierto de Puerto Madryn. Sabemos que las poblaciones de gaviotas se incrementaron por muchos años,

hasta el '97 y luego se mantuvieron constantes. Las causas principales fueron los descartes pesqueros y los basurales a cielo abierto. Es por eso que el plan puesto en marcha por la Provincia para erradicar los basurales a cielo abierto en todo Chubut es un increíble avance sobre la minimización del impacto ambiental, y es posible que la reproducción de gaviotas se equilibre.

6.6 GAVIOTIN SUDAMERICANO

STERNA HIRUNDINACEA

El Gaviotín Sudamericano es una de las 3 especies de gaviotines que nidifican en el litoral marino de Argentina y por supuesto, no podían faltar en Península Valdés. Es bastante mas difícil de observar que la Gaviota Cocinera, porque tiene un tamaño poblacional reducido.

En Diciembre empieza la época reproductiva y ya se los ve sobrevolando por las restingas y acantilados. Después de su época de nidificación, a partir de marzo ya no son previsible. Todos los años nidifican, pero no en los mismos lugares, suelen escoger lugares

costeros tranquilos, en sitios muy expuestos aunque son muy sensibles a los disturbios.

Los peces dominan su dieta, su técnica de pesca es zambullirse en la superficie del mar en picada para capturar sus presas.

6.7 CORMORAN IMPERIAL

PHALACROCÓRAX ATRICEPS

El cormorán de Ojos Azules es muy similar al cormorán real, por eso también se denominan a las dos especies Cormorán Imperial.

A lo largo de todo el litoral de la Patagonia continental, el Cormorán Imperial es una especie prácticamente piscívora aunque también se alimenta de invertebrados marinos tales como cefalópodos, crustáceos y poliquetos. El Cormorán Imperial consume una gran proporción de peces pelágicos y demersales, tales como anchoíta, merluza común y

algunas especies de pejerrey y utiliza un rango de profundidades muy amplio en toda la columna de agua. Estudios recientes, mostraron que el Cormorán Imperial se alimenta tanto en aguas costeras de poca profundidad como en aguas profundas (alrededor de 70m) y alejadas de la costa (más de 8 km).

El Cormorán Imperial es el principal productor de guano en la Patagonia. En la actualidad, el guano se extrae en solo unas pocas colonias de Chubut y Santa Cruz. La explotación guanera continua realizándose de manera similar a unas décadas atrás, llevando a cabo la extracción en forma manual y discontinua.

6.8 CORMORAN REAL

PHALACROCÓRAX ATRICEPS ALBIVENTER

Miden entre 60 y 70 cm. Pertenecen al orden pelecaniformes cuyo carácter más notable consiste en tener los cuatro dedos de las patas unidos por una membrana, lo que las distingue de cualquier otra ave palmípeda. El cormorán Real que anida en salientes de restingas, comparten a veces las zonas con lobos marinos, forman colonias de decenas de individuos y al igual que todos los cormoranes se alimentan de peces.

Son excelentes buceadores y una característica es que se propulsan debajo del agua con las patas, a la inversa que los pingüinos que usan sus alas para nadar. El plumaje de los Cormoranes es poco impermeable y por esto deben secarse al sol con las alas y la cola extendidas.

6.9 CORMORÁN ROQUERO

PHALACROCORAX MAGELLANICUS

Anidan en las paredes acantiladas de los golfos San José y Nuevo. Formando colonias importantes. En Puerto Pirámides se puede visitar, una colonia desde las embarcaciones de avistaje de ballenas o paseos náuticos, cerca de la Punta Pirámide.

CICLO REPRODUCTIVO

En términos generales, el ciclo de nidificación se inicia a principios del mes de octubre cuando los

adultos comienzan a ocupar y a reconstruir el nido. La postura de los huevos comienza entre la última semana de octubre y las primeras de noviembre, tanto en las colonias de Chubut, como en las de Santa Cruz.

La postura de los huevos se completa en periodos que van de cuatro a 12 semanas, desde el inicio de la postura de los primeros huevos.

El nacimiento de los pichones tiene lugar entre los meses de noviembre

y diciembre y la independencia de los mismos ocurre entre finales de enero y febrero.

Esta especie no presenta una marcada dispersión invernal, por lo que la mayoría de los adultos reproductivos de Cormorán Cuello Negro permanecen durante todo el año en las colonias de nidificación o en sus áreas cercanas.

ALIMENTACION

Su dieta está compuesta principalmente por peces bentónicos (los que viven cerca del fondo) y en menor proporción, por unas pocas especies de peces pelágicos (los que se mueven en grandes cardúmenes) e invertebrados marinos (cefalópodos, poliquetos y crustáceos). Se alimenta por lo general en aguas poco profundas (no mayores a 10 m) y cercanas a la costa (no más lejos de 5 Km.)

6.10 CORMORAN BIGUA

PHALACROCÓRAX OLIVACEUS

Es frecuente verla volando velozmente, al ras del agua con un vuelo recto y preciso; y de vez en cuando tocan la superficie con la punta de las alas.

ALIMENTACION

Esta especie es básicamente piscívora. Sin embargo, las mismas observaciones sugieren que, a diferencia del Cormorán Cuello Negro

y el Cormorán Imperial, la dieta de esta especie está constituida por una alta proporción de peces que se desplazan en cardúmenes y cerca de la superficie tales como el pejerrey y peces de fondo como el róbalo. En los ambientes marinos, el Biguá ha sido observado alimentándose tanto en forma individual como en bandadas. Se alimenta principalmente en aguas costeras y de poca

profundidad (menores a 1.3 km y no más de 10 m de profundidad). Luego de sus zambullidas en busca de alimento, es común verla con las alas desplegadas hacia el sol sobre alguna rama segura, para librarse de la humedad.

Construyen los nidos con ramas que cementan con su propio guano.

6.11 OSTRERO NEGRO

HAEMANTOPUS PALLIATUS

El Ostrero es un ave corpulenta y de gran tamaño, que puede alcanzar algo más de 40 cm de longitud. Su peso oscila entre los 400 y 700 gramos.

El plumaje es de un negro muy intenso en las partes superiores del animal: el lomo, la cabeza y el cuello. Las partes inferiores en cambio, son de un blanco níveo. Las alas son negras.

Se destaca por la tonalidad de su pico largo y comprimido lateralmente de color naranja a rojo brillante y sus ojos anaranjados-rojizos. Para completar el “collage”, sus patas son rosadas.

El vuelo es fuerte, caminan y corren velozmente. Ocasionalmente nadan.

COMPORTAMIENTO

Es un animal bastante gregario siendo frecuente la observación de pequeños grupos, moviéndose ágilmente en tierra.

Son muy territoriales. Gran parte de su tiempo lo ocupan para defenderlo. Es frecuente verlos en vuelos acrobáticos tratando de alejar a ocasionales invasores de su misma especie.

Según algunos estudios, se indica que la población de Ostreros está experimentando un leve decrecimiento.

Las causas posibles apuntarían al expolio humano de los nidos o bien a la destrucción de los mismos provocada por la creciente ocupación costera y el tránsito cada vez más frecuente de vehículos areneros utilizados para recreación en zonas de anidación.

A esto se le agrega la disminución de los recursos alimenticios sometidos a la explotación para consumo humano.

ALIMENTACION

El Ostrero Común utiliza áreas costeras de todo tipo: playas arenosas, estuarios y acantilados rocosos; alimentándose principalmente de moluscos bivalvos, caracoles, pequeños crustáceos y gusanos.

Localiza las presas visualmente o sondeando los fondos fangosos con el pico, muy sensible al tacto.

Cuando se trata de moluscos de concha dura, los trabaja hábilmente sobre sustratos rocosos, rompiendo a picotazos pedazos de concha y cortando los músculos aductores para provocar la separación de las dos conchas de los bivalvos y así poder extraer la carne tierna del interior.

6.12 PETREL GIGANTE

MACRONECTE GIGANTEUS

Esta particular ave tiene una forma increíblemente aerodinámica. La distancia entre las puntas de las alas extendidas llega a 2m. Un macho adulto puede pesar hasta 5 kg.

La característica de la Familia son las narinas, ubicadas en la parte superior del pico bajo la forma de un único tubo nasal, pero dividido internamente en dos por un tabique central.

El monitoreo de ejemplares demostró que vuelan distancias increíbles. Un ejemplar anillado en Nueva Zelanda se vió una semana después en las costas patagónicas, lo que implica que volaron sobre el agua ¡mas de 5000 km en menos de 7 días!

ALIMENTACION

Tienen un excelente olfato lo que lo ayuda a encontrar alimento en la costa, no siempre come carroña de pingüinos, lobos y elefantes marinos muertos también se alimenta de pichones de pingüinos, de otras aves, huevos y a veces caza pingüinos y otras aves marinas para alimentarse.

En el mar se alimentan de desperdicios arrojados por los cientos de barcos pesqueros que arrojan los peces no deseados para consumo, es decir, toneladas de pescados muertos que a diario desechados en el mar. Los restos de esta depredación humana está haciendo que las aves como el Petrel Gigante

tengan mas comida y tengan capacidad de supervivencia mayor de la habitual y un ciclo de reproducción mucho mas productivo. En consecuencia son aves que en la actualidad se ve en número desproporcionado a años anteriores.

REPRODUCCION

En las colonias del norte de Patagonia, la fecha de puesta (un sólo huevo) se inicia durante la última semana de octubre, es relativa-

mente sincrónica y los primeros nacimientos tienen lugar durante la última semana de diciembre. Los adultos permanecen en el nido con el pichón durante casi dos semanas, momento a partir del cual, los pichones comienzan a quedar solos en la colonia mientras los padres se alimentan en el mar para la posterior alimentación del pichón por regurgitación.

En Patagonia, la independencia de los pichones ocurre hacia la segunda semana de marzo y principios de abril.

Podrá ver de cerca al petrel en Punta Norte.

6.13 PATO CRESTON ANDINO

ANAS SPECULAROIDES

El pato crestón vive en lagunas, lagos y ríos de agua dulce y en las costas marinas, andinas y patagónicas, hasta los 4.700 msnm. Pone de cinco a ocho huevos de color crema. La incubación tarda aproximadamente 30 días. Se alimentan de moluscos e invertebrados y también comen algunas algas, miden entre 50 y 60 cm y pesan algo más de un kg. Durante el invierno esta subespecie se desplaza por ambas costas hacia el norte llegando al centro de Chile y Argentina.

La longitud total es de 51 a 61 cm. El macho, más grande que la hembra, pesa entre 1 y 1,2 Kg. Posee una cola aguda, aunque la hembra

la tiene menos aguda que el macho. El pato crestón es de coloración parda ocrácea manchada, con rabadilla y vientre más claros.

Presenta una amplia corona (salvo en la frente) y leve copete nu-

cal oscuro. Es de tonos modestos, salvo en el vuelo, en el que puede observarse un espejo morado y blanco. La coloración del iris de los ojos es rojiza.

6.14 CHIMANGO

MILVAGO CHIMANGO

El Chimango es un ave de rapiña característica de Argentina, Uruguay, algunas regiones de Chile y el sur de Brasil. En Península Valdés es un ave solitaria.

Su dieta alimenticia es variada, es carroñero, insectívoro y una verdadera ave de presa que captura pequeños roedores gracias a que tiene muy buena vista.

En la región anidan en forma solitaria, pero también suelen anidar en colonias.

Esta ave rapaz mide unos 40 cm, siendo la hembra un poco más grande en tamaño.

Anidan en arbustos protegidos del sol y de la lluvia. La hembra pone entre 2 y 5 huevos y los empolla durante 4 semanas, una semana después los pichones abandonan el nido.

Por su dieta variada y abundante el chimango es uno de los más eficientes y completos auxiliares que tiene el hombre para controlar enfermedades y plagas.

6.15 GARZA BLANCA

ARDEA ALBA

Esta elegante ave, estuvo a punto de ser extinguida para comienzos de 1.900. La causa de este exterminio fue el haberse impuesto en la moda femenina el uso de “aigrette” que se confecciona con las plumas que el macho luce sobre el dorso en la época de formar su pareja.

Estas plumas por su vistosidad, adquirieron gran valor y los cazadores persiguieron tenazmente a esta ave sin ninguna clase de control y sin respetar la época de cría. Finalmente esta situación se sobrepuso y comenzaron a aplicarse las

leyes que defienden nuestra fauna; de esta forma la hermosa garza blanca pudo sobrevivir y en estos últimos años se puede apreciar un mayor número de éstas aunque siguen siendo escasas.

REPRODUCCION

Cuando anidan, lo hacen en colonias de varias parejas, que pueden llegar a ser más de 20 individuos. Para realizar sus nidos eligen zonas arboladas en cuyas copas lo construyen juntando grandes cantidades de ramas, juncos, hojas secas; formando una gran plataforma en la cual se efectúa la postura que consiste en de seis a ocho huevos de color celeste uniforme.

Al nacer los polluelos, son los padres los encargados de proporcionarles el alimento que consiste en sapitos, ranitas y lagartijas, peces pequeños etc. dependiendo de la región en la que se encuentren; hasta que los polluelos se encuen-

tran en condiciones de salir a buscar su alimento, aproximadamente a las cuatro semanas. Cuando adquieren la edad suficiente para alimentarse por sí solos y pueden volar, los padres abandonan los polluelos. La garza busca su alimento cada una por su lado, pero descansa y anida por bandadas.

Cuando vuelan son fácilmente reconocibles puesto que lo hacen con las patas estiradas hacia atrás y su cuello doblado en forma de “S”, surcando el aire en forma majestuosa y en perfecta formación buscando lugares más cálidos.

6.16 MARTINETA

EUDROMIA ELEGANS

La Martineta Copetona es una especie de particular comportamiento. Es un ave terrestre caminadora, que sólo en caso de persecución alza un trecho corto de vuelo, prefiere esconderse y permanecer inmóvil, mimetizándose con la vegetación del lugar. Tiene un andar muy sofisticado, de ahí que su nombre científico incluya la palabra elegans. Como si esto no fuera suficiente, su cabeza moteada de negro y café amarillento está adornada con un largo y fino copete rebatido hacia adelante en las puntas.

Toma frecuentes baños de polvo.

La alimentación de la Martineta Copetona está constituida por insectos, semillas, frutos silvestres y tallos tiernos.

Es muy útil para el saneamiento de los campos, porque al ser su alimentación tan variada destruye toda clase de insectos en general.

Cuando un peligro las acecha -principalmente la presencia de alguna de las aves rapaces- se agrupan y avanzan en forma compacta y si alguna de ellas queda rezagada, inexorablemente será víctima del predador que espera el momento propicio.

Siempre que están en colonias mantienen un vigía, éste cuando presiente un peligro echa a volar imitándolo el resto. Si por el contrario, se agacha y no levanta vuelo, las demás hacen lo mismo. Sus predadores naturales son las aves rapaces (halcones, aguiluchos), mamíferos (zorros, zorrinos, hurones) durante todas sus etapas (huevos, pichones y adultos).

REPRODUCCION

Las hembras Martinetas Copetonas son poliándricas; atienden a un número variable de machos, depositando huevos en los nidos de éstos.

Estudios sobre la reproducción de esta especie hechos por dos norteamericanos en Península Valdés, Provincia de Chubut, describen los hábitos reproductivos de *Eudromia elegans* en estos términos:

“..una hembra realiza la postura de 14 huevos (máximo) en el nido de un macho. Luego del desove, comienza a visitar el nido de otro macho. Así hasta completar entre siete y ocho nidos en la estación reproductiva. Un hecho notable es que si uno de los machos pierde por predación una cantidad cualquiera de huevos, la hembra le repone primero la pérdida, para continuar luego atendiendo a otros machos.

Al cabo de tres semanas los pi-

chones rompen el cascarón, y en cuanto se secan ya están en condiciones de desplazarse por sí solos.

Al nacer presentan el aspecto de una pequeña bola de algodón color gris. Al cambio de los plumones conservan definitivamente el característico color grisáceo. El padre guía a los polluelos buscándoles alimento que por sí solos engullen, al mismo tiempo los protegen de los peligros naturales.

Cuando presienten algún extraño en las cercanías, hace una señal y como por encanto se quedan todos agachados e inmóviles mimetizándose en el ambiente.

Se hace así difícil a primera vista

localizarlos y no se mueven aunque se esté a escasos centímetros de los mismos.

A las dos semanas ensayan los primeros vuelos y paulatinamente, van independizándose para -a las cuatro semanas, adquirir la mayoría de edad- abandonando a su protector definitivamente”.

6.17 AGUILUCHO COMUN

BUTEO POLYOSOMA

Al aguilucho común, también conocido por Ñanco, se lo puede ver en toda la Península Valdés. Los machos miden hasta 48 cm y la hembra es un poco más grande, llegando a los 52 cm.

Tiene el plumaje dorsal gris y el ventral es blanco en los adultos. Su característica más sobresaliente es una raya negra al final de la cola.

Los ejemplares jóvenes mantienen durante dos años el plumaje rayado y manchado de parduzco, sus patas son amarillas.

Se alimenta de pequeños mamíferos no más grandes que la liebre, también de diversos pájaros, incluye en su dieta a reptiles, anfibios e invertebrados. Su método para cazar consiste en volar de manera circular sobre la presa y lanzarse en diagonal sobre esta golpeándola con sus poderosas patas por la es-

palda de la víctima.

La construcción del nido la realizan ambos miembros de la pareja, le gustan los árboles con pinches, es por eso que en esta región anidan preferentemente en los Molles, también anidan en los postes de luz. El nido es de gran tamaño, casi un metro de diámetro y está hecho con palitos. El macho alimenta a la hembra durante la incubación y después del nacimiento de los pichones en el mes de diciembre, ella se encargará de estos últimos.

La creencia popular, dice que si uno está viajando y se cruza con un Ñanco de frente es un buen augurio para lo que resta del viaje o la jornada, si se lo cruza dando la espalda, significa que hay que tener precaución en el recorrido, hasta llegar a destino.

6.18 LECHUCITA DE LAS VISCACHERAS

ATHENE CUNICULARIA

Su denominación como especie “cunicularia”, significa en latín “que cava minas o túneles”. Porque es de esta manera como construye su nido: en cuevas subterráneas.

Lo hace en lugares abiertos, pero eligiendo la protección de algún árbol o arbusto. Elige para ello un terreno con pendiente para evitar que el agua de lluvia lo inunde.

De todas maneras si la suerte acompaña, utilizará alguna cueva abandonada hecha por otro animal que le ahorró el trabajo.

Comúnmente construye sus cuevas en los costados de los campos de cultivo o al borde de los caminos; cuando el arado bloquea su entrada, construye otra cueva en los linderos del campo.

La época de nidificación va de octubre a diciembre. Durante el celo se los ve frotando sus picos o mimándose mutuamente. Los pichones nacen a los 28 días.

La lechuza no huye del hombre sino que, por el contrario, se adapta con facilidad a su presencia.

Habita en pastizales abiertos, se las puede encontrar en la zona de Punta Delgada y Caleta Valdés.

ALIMENTACION

Muchas veces el hombre suele atacar a las lechuzas especialmente por la irracionalidad que le ocasionan las supersticiones.

Esas matanzas se vuelven en su contra pues se altera riesgosamente el equilibrio ambiental ya que estas aves consumen insectos

y otros animales perjudiciales para los cultivos y en especial porque en su dieta incluyen a los roedores relacionados con la fiebre hemorrágica o mal de los rastrojos, que es una enfermedad endémica en Argentina.

Además su dieta está compuesta por pájaros, escorpiones, anfibios, cangrejos lagartijas, y culebras.

Posee un perfeccionado sentido auditivo. Pueden percibir sonidos de muy baja intensidad que les per-

miten detectar la presencia de sus pequeñas presas. La densa capa de plumas que cubre su rostro chato, opera como una especie de pantalla receptora que ayuda a que los sonidos desemboquen en los oídos.

Sus depredadores naturales son el hurón, la comadreja, los felinos y los zorros; además del hombre.

Seguramente tendrá contacto visual con alguna de ellas. Y si cuenta con binoculares, podrá disfrutar de

esa mirada profunda y directa que parte de sus grandes ojos.

Éstos, al igual que los nuestros, están colocados en el frente. Por lo tanto su visión es binocular y le permite una percepción afinada de las distancias. Cuentan con numerosas células fotosensibles y pupilas con un gran ángulo de apertura, elementos que le permiten distinguir objetos aunque la luz sea muy tenue.

6.19 LORO BARRANQUERO

CYANOLISEUS PATAGONUS

Suele verse por Península Valdés en los meses de primavera y verano. Tiene su pareja de por vida y anidan en acantilados. Ambos cavan una cueva profunda con sus patas, para depositar entre 2 y 5 huevos, que empollan hasta fines de diciembre, momento en el que nacen los pichones.

Estos loros son muy vistosos y lucen siete colores en su plumaje.

En Península Valdés se los ve en bandadas de 10 a 20 individuos, son muy ruidosos y parlotean todo el tiempo.

Su alimentación es a base de brotes y frutos de arbustos, y también viajan grandes distancias para alimentarse en otras regiones sintiéndose atraídos por los campos sembrados, despertando muchas veces la ira de los campesinos porque les comen la siembra y perjudican sus cosechas.

La Hostería Ecológica quiere recomendar un lugar único para los viajeros, ornitólogos y aquellos que

se sientan atraídos por las aves y la naturaleza. A 550 km al norte de Península Valdés, existe una localidad balnearia llamada el Condor, la playa de Viedma capital de Río Negro.

En este preciso lugar existe la colonia de loros mas grande del mundo, hay mas de 100.000 loros barranqueros en 9 km de acantilado, algo imposible de apreciar, en otro lugar en este planeta. Sor-

prendidos nos quedamos cuando vimos ese increíble acantilado, otro asombro natural de la Patagonia Argentina, oculto en nuestra infinita ignorancia. Si decide ir a pasar algunas noches a este balneario le recomendamos el Apart Hotel Costa del Faro , ubicado en la costa, a metros del acantilado.

Si desea ir a El Cóndor, consulte en recepción.

6.20 CABECITA NEGRA DE CORBATA

CARDUELIS MAGELLANICA

Esta ave pequeña, llega a medir 12 cm y es posible verla desde Tierra del Fuego a Jujuy. Nos las encontramos en Caleta Valdés, anidando en los acantilados, vecinas de la golondrina barranquera, juntaba pasto y pajitas para arreglar el nido en una cueva que ocuparon.

Estas aves anidan en las ramas de los árboles, pero en esta rara ocasión la encontramos en este hogar bien sólido y con vista privilegiada. Se alimenta de semillas y brotes y en la etapa de reproducción pone de 3 a 6 huevos. Un dato curioso, de las 112 especies de Cabecitas Negras que existen, solo el Cabecita Negra de Corbata vive en las costas Patagónicas.

En los lugares de acampe cordilleranos es común verlos recorriendo los fogones apagados de los acampantes, revolviendo las cenizas en busca de restos de alimentos que puedan haber dejado los ocupantes.

Son muy activos y movedizos. Si sienten la proximidad de un ser humano, inmediatamente se retirarán a lo alto del árbol más próximo hasta que regrese la tranquilidad.

Se lo suele ver en parejas o grupos pequeños en épocas de reproducción, aunque fuera de esa época se agrupa en grandes bandadas.

6.21 CALANDRIA

MIMUS PATAGONICUS

La Calandria es un pájaro nativo de América, tiene un canto increíble por lo melodioso y lo variado del repertorio sumado a una habilidad innata para imitar sonidos. Una particularidad de las calandrias es su capacidad para imitar el canto de otras aves (que reproducen introduciendo ligeras variaciones), peculiar comportamiento que es origen del nombre científico del género (Mimus en latín, significa imitador, mimo).

Su plumaje es grisáceo tirando al ocre en las plumas del lomo

y mas claro en el cuello y el pecho, éste es su razgo característico. En Pirámides, es frecuente verlos posados y cantando sobre los arbustos de atrás de la hostería, y en el verano cuando el Yuyín da frutos, se lo ve también comiendo estas bolitas color rojo, similar a la del piquillín.

En su dieta también hay insectos y vuelan tras las mariposas y polillas que visibles en su campo de acción. Se lo puede encontrar por toda la Península Valdés, fácilmente en Punta Norte y en Caleta Valdés.

REPRODUCCION

La calandria prefiere anidar en arbustos pequeños y aislados. En general establece el nido en una horqueta no muy alta. El nido tiene forma de taza. Para construirlo, ambos miembros de la pareja emplean ramas de todo tipo y pasto, que va entrelazando desordenadamente. El interior es más prolijo: está recubierto con pajitas, crines y a veces lana. La hembra pone entre tres y cinco pequeños huevos, que miden aproximadamente tres por dos centímetros y son de color celeste verdoso con manchas pardo

rojizas. El período de incubación se extiende de trece a quince días, y es la hembra quien se ocupa de dicha tarea. El desarrollo de los pichones es rápido y pueden abandonar el nido ya al noveno día, pero por lo general permanecen en él entre doce y catorce. Lo habitual es que vuelen muy poco o nada al dejar el nido, permaneciendo una o dos semanas ocultos entre el follaje. Pasado este período, siguen a sus padres pidiéndoles alimentos. Los dos padres se ocupan de alimentar a las crías.

6.22 GOLONDRINA NEGRA

PROGNE ELEGANS

La Golondrina Negra es un ave migratoria, que arriba en primavera a Península Valdés, tiene un canto dulce y agradable que emite cuando vuela o está posada, normalmente acompañada de otras golondrinas. Es una excelente voladora capaz de surcar los aires a una gran velocidad y tomar nuevas trayectorias en breves instantes de tiempo.

Son muy pequeñas miden menos de 20 cm y pesan unos 20 g. El macho tiene un color negro con reflejos purpuras y la hembra tiene las partes inferiores grises, moteadas de negro. Ponen varios huevos y tiene 2 semanas de incubación y a los 20 días el pichón abandona el nido.

En el momento de la migración, ya sea de ida o de vuelta entre el área de reproducción y cría y el de invernada, pueden recorrer una

distancia de 12.000 km, esta especie particularmente migra a Perú, promediando los 200 Km por día. Son insectívoras y se alimentan durante el día.

Se las puede ver volando por todo Puerto Pirámides, les gusta anidar en los techos de las casas, pelean con los gorriones que están todo el año en el lugar, por el nido en el que ellas estuvieron el año anterior, a diferencia de la Golondrina Barranquera, que migra desde Colombia y se instala en Caleta Valdés.

Excluyen de su menú a aquellos que poseen aguijones venenosos. A su vez, ellas constituyen el alimento de las aves rapaces, félidos, roedores y culebras. Estas últimas son los principales depredadores naturales de sus huevos y pichones.

La golondrina es el ave característica de la primavera, porque vive eternamente en primavera.

Hace su nido en los huecos de las paredes y en los tejados, con pajitas apelmazadas entre sí, que luego mulle con plumas, fibras y lanas.

MIGRACION

Cuando se aproxima el fin de la estación estival, se las ve más agita-

das que de costumbre.

Su agitación, sus gritos y sus maniobras diarias son un indicio seguro de su próxima desaparición. Por fin, cuando llega el día de la partida, se juntan todas y se elevan lentamente hacia las altas regiones aéreas, gritando y dando vueltas. Es como una especie de despedida. El viaje se inicia a cualquier hora del día, si bien tienen preferencia por la tarde y salen generalmente cuando el sol cae en el horizonte.

Se van en grupo, pero vuelven en parejas. Vuelan con mucha rapidez y descansan de vez en cuando, pero en forma relativamente breve.

Sólo vuelan de día y no se detienen

para alimentarse. En el momento en que inician la partida, vuelan en círculo sobre el lugar, y durante el viaje comen los diminutos insectos que se adhieren a sus alas.

En algunas ocasiones una golondrina se pierde o falta a la cita de la partida. Entonces pasa el invierno a la manera de los murciélagos: adormecida en un refugio y realizando de cuando en cuando, en las horas cálidas del día, un vuelo de alimentación. Ésta es la razón de que -a veces- se vea una golondrina en invierno.

Por esto, como observaba filosóficamente Aristóteles, una sola golondrina no hace verano.

6.23 GOLONDRINA BARRANQUERA

NOTIOCHELIDON CYANOLEUCA

La Golondrina Barranquera es un pequeño pájaro migratorio que visita de septiembre a abril algunos lugares de la Patagonia.

Uno de esos lugares es Península Valdés, con una característica por demás peculiar: a diferencia de la Golondrina Negra, que se encuentra también dentro de Península Valdés, pero en Puerto Pirámides, las de Caleta Valdés y en los acantilados que nos rodean migran a Colombia, mientras que la que vemos en Puerto Pirámides lo hacen a Perú, en ambos casos de abril a agosto.

Las golondrinas son netamente insectívoras. Su dieta está integrada preferentemente por moscas, mosquitos, hormigas aladas, libélulas y pequeños coleópteros -ésto es- por pequeños insectos voladores.

INFORMES

Si desea estar al tanto de lo que sucede en estos momentos en la península, visite:

eco-lodge.blogspot.com

Para mayor información sobre la hostería, visite:

www.ecohosteria.com.ar

AV. DE LAS BALLENAS S/N
PUERTO PIRÁMIDES
(U9121XAQ)
PENÍNSULA VALDES -
CHUBUT
PATAGONIA ARGENTINA